

# LE SÉMINAIRE DE MATHÉMATIQUES 1933–1939

édition réalisée et annotée par  
Michèle Audin

## 4. Année 1936-1937 *Travaux d'Élie Cartan*

André Weil

**Formes différentielles extérieures**

*Séminaire de mathématiques* (1936-1937), Exposé 4-A, 9 p.

<[http://books.cedram.org/MALSM/SMA\\_1936-1937\\_\\_4\\_\\_A\\_0.pdf](http://books.cedram.org/MALSM/SMA_1936-1937__4__A_0.pdf)>



Cet article est mis à disposition selon les termes de la licence  
CREATIVE COMMONS ATTRIBUTION – PAS DE MODIFICATION 3.0 FRANCE.  
<http://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/fr/>

**cedram**

*Exposé mis en ligne dans le cadre du*  
*Centre de diffusion des revues académiques de mathématiques*  
<http://www.cedram.org/>

## FORMES DIFFÉRENTIELLES EXTÉRIEURES

par **André Weil**

Le calcul<sup>[1]</sup> des formes différentielles extérieures a pris à l'époque moderne une importance considérable, grâce surtout aux travaux de M.E.Cartan où il joue un rôle essentiel. Ce calcul présente deux aspects, l'un purement algébrique, c'est le calcul de Grassmann;<sup>[2][3]</sup> l'autre aspect est proprement différentiel, et sous cette forme, ce calcul est principalement l'œuvre de M.Cartan. Nous allons examiner successivement ces deux calculs.

### 1.- Calcul de Grassmann

Il a été découvert par Grassmann qui l'a exposé dans son « Ausdehnungslehre »,<sup>[4]</sup> où il en a donné toutes sortes d'applications géométriques. Soit  $k$  un corps (le corps des constantes) et soit  $k^n$  un espace vectoriel à  $n$  dimensions sur  $k$ ; en choisissant dans  $k^n$  une base de  $n$  vecteurs indépendants  $e_i$ ,  $k^n$  apparaît comme l'ensemble des vecteurs  $x = \sum_1^n x_i e_i$ , les  $x_i$  étant dans  $k$ .

On appellera *algèbre extérieurement* ou *algèbre de Grassmann* sur  $k^n$ , un système hypercomplexe sur  $k$ ,  $G = G(k^n)$  avec les propriétés suivantes :

- 1°-  $G$  contient un élément unité (désigné par 1) et tous les éléments de  $k^n$ ; et  $G$  est engendré par ces éléments.
- 2°- Si  $x, y$ , sont deux éléments de  $k^n$ , leur produit dans  $G$  obéit à la loi :  $yx = -xy$ .  
(Si  $k$  n'est pas de caractéristique 2, il en résulte que :
- 3°- quel que soit  $x$  dans  $k^n$ ,  $xx = 0$ ; si  $k$  est de caractéristique 2, on ajoute 3° comme axiome).
- 4°- Les éléments de  $G$  ne satisfont pas à d'autres relations qu'à celles qui se déduisent de 2° et 3°.

La multiplication dans  $G$  porte le nom de multiplication extérieure; chaque fois que ce sera utile pour éviter des confusions, on la désignera par le signe  $\wedge$ .

En vertu de 1<sup>o</sup>, tout élément de  $G$  est une combinaison linéaire (avec coefficients dans  $k$ ) de termes  $e_{i_1} \cdot e_{i_2} \cdots e_{i_m}$ ; en vertu de 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup>, deux termes de cette forme sont égaux au signe près s'ils se déduisent l'un de l'autre par une permutation des facteurs (ils sont égaux si la permutation est paire, opposés si elle est impaire); et un tel terme s'annule s'il contient deux facteurs identiques; en particulier, le degré d'un tel terme étant le nombre de ses facteurs  $e_i$ , tout terme de degré  $> n$  est nul, et il n'y a, au signe près, qu'un seul terme de degré  $n$ , à savoir  $e_1 e_2 \cdots e_n$ . Il en résulte que  $G$  possède une base formée de 1 et des éléments  $e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_m}$  tels que  $1 \leq m \leq n$ ,  $i_1 < i_2 < \cdots < i_m$ , la loi de multiplication de ces éléments de base étant parfaitement déterminée par 2<sup>o</sup> et 3<sup>o</sup>; et par conséquent,  $G(k^n)$  existe et est entièrement déterminée. Bien entendu, puisque la définition de  $G(k^n)$  ne fait pas intervenir les éléments de base  $e_i$ ,  $G(k^n)$  est attaché à l'espace  $k^n$  d'une manière invariante; cette algèbre est donc particulièrement bien adaptée à l'étude de la géométrie affine dans  $k^n$ .

Considérons l'effet d'un changement de base  $e_i = \sum c_{ij} e_j$  sur<sup>[5]</sup> les coefficients d'un élément donné de  $G$ ,  $A = \sum a_{i_2 i_2 \dots i_m} e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_m}$ . Évidemment chaque terme se transformera en somme de termes de même degré, de sorte qu'il suffit de considérer le cas où tous les termes de  $A$  ont même degré  $m$ : dans ce cas,  $A$  sera appelée une forme de degré  $m$ . (Observons que si  $A, B$  sont des formes de degré respectif  $p, q$ , leur produit satisfait à la loi  $AB = (-1)^{pq} BA$ , car il en est ainsi lorsque  $A$  et  $B$  se réduisent à un seul terme, donc aussi, en vertu de la distributivité, dans le cas général). Évidemment toute forme  $A$  de degré  $m$  pourra être écrite sous la forme  $A = \sum a_{i_2 i_2 \dots i_m} e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_m}$ , la sommation étant étendue à toutes les combinaisons de  $m$  indices distincts  $i_1, i_2, \dots, i_m$ , et les coefficients  $a$  étant *symétriques gauches* (on dit aussi antisymétriques) par rapport à ces indices, c'est-à-dire qu'une permutation paire sur les  $m$  indices ne change pas  $a$ , et qu'une permutation impaire remplace  $a$  par  $-a$ . Alors, en faisant la substitution  $e_i = \sum c_{ij} e_j$ , on voit que les coefficients  $a$  se transforment comme des tenseurs covariants antisymétriques à  $m$  indices (les  $e_i$  étant considérés comme des vecteurs contravariants). Il y a donc identité entre les formes de degré  $m$  dans  $G$  et les tenseurs covariants antisymétriques à  $m$  indices dans  $k^n$ .

Soit  $V^p$  une variété à  $p$  dimensions<sup>[6]</sup> dans  $k^n$ : l'algèbre  $G(V^p)$  est évidemment isomorphe à la sous-algèbre de  $G(k^n)$  qui est engendrée par 1 et les éléments de  $V^p$ ; en particulier, cette algèbre contient, à un facteur constant (scalaire) près, un élément et un seul de degré  $p$ , à savoir  $v_1 v_2 \cdots v_p$ , si les  $v_i$  sont un système de vecteurs de base de  $V^p$ ; en particulier, la condition nécessaire et suffisante pour que les  $v_i$  soient indépendants, est que ce produit ne soit pas nul. Si on pense à d'autres vecteurs  $w_i = \sum c_{ij} v_j$  l'on aura  $w_1 w_2 \cdots w_p = c \cdot v_1 v_2 \cdots v_p$ , et la constante  $c$  est le déterminant des  $c_{ij}$  (on peut le vérifier, ou; ce qui vaut mieux, prendre ceci comme définition des déterminants).

Ainsi, à toute variété  $V^p$  est attachée une forme de degré  $p$ , bien définie à un facteur scalaire près, et qui peut s'exprimer comme produit de  $p$  formes de degré 1: une telle

forme s'appellera une forme complètement décomposable de degré  $p$ ; les coefficients de cette forme, exprimés au moyen des éléments de base  $e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_p}$ , forment un système de coordonnées homogènes pour  $V^p$  (pour le cas  $n = 1$ ,<sup>[7]</sup> ou, ce qui revient au même, pour le cas des droites dans l'espace projectif à trois dimensions, on retrouve ainsi les coordonnées dites plückeriennes); ils satisfont à certaines relations quadratiques qui ont été données par Grassmann.

Soient  $V^p$ ,  $W^q$  deux variétés, et  $A$ ,  $B$  les formes associées, de degrés respectifs  $p$ ,  $q$ ; on pourra exprimer au moyen de  $A$ ,  $B$ , les propriétés géométriques de  $V$ ,  $W$ . Par exemple, le fait que  $V$  contienne  $W$  s'exprimera par le fait que  $A$  soit multiple de  $B$ ;  $A$  et  $B$  auront une intersection non réduite à 0 si  $AB = 0$ ; si au contraire, l'intersection de  $V$ ,  $W$  se réduit à 0, la forme  $AB$  correspond à la variété à  $p + q$  dimensions qui contient  $V$  et  $W$ ; etc.....

## 2.- Formes associées

À toute forme de degré  $p$ ,  $A$ , on associe (d'après Grassmann) une forme  $A^*$  de degré  $n - p$  par la règle suivante :<sup>[8]</sup> Si d'abord  $A$  se réduit à un terme  $e_{i_1} e_{i_2} \cdots e_{i_p}$ , on lui associe une forme  $A^* = \pm e_{j_1} e_{j_2} \cdots e_{j_{n-p}}$ , telle que  $AA^* = e_1 e_2 \cdots e_n$ ; il est facile de voir que  $A^*$  est déterminée d'une manière unique. Et l'on convient que la correspondance entre  $A$  et  $A^*$  est linéaire : étant définie pour la base de  $G$ , elle est donc définie pour tous les éléments de  $G$ . 5/6

Il est naturel, puisque la définition de  $A^*$  fait intervenir la base  $e_i$ , que cette définition ne soit pas invariante par rapport à un changement de base. Il est facile de trouver le groupe qui laisse invariante la correspondance entre  $A$  et  $A^*$ . Tout d'abord, si  $A = 1$ ,  $A^* = e_1 e_2 \cdots e_n$  donc le groupe est unimodulaire. De plus, si  $x = \sum x_i e_i$ , on a  $xx^* = (\sum x_i^2) e_1 e_2 \cdots e_n$ , donc le groupe laisse invariante la forme  $\sum x_i^2$ . Réciproquement, on vérifie par un calcul facile que toute substitution orthogonale de déterminant 1 laisse invariante la correspondance entre  $A$  et  $A^*$ . La notion de forme associée permet donc d'exprimer les notions de la géométrie euclidienne. En particulier, soit  $V^p$  une variété à  $p$  dimensions; soit  $A$  la forme correspondante de degré  $p$ ; par une substitution orthogonale qui amène les  $p$  premiers vecteurs coordonnés à être dans  $V^p$ , on voit que  $A^*$  n'est pas autre chose que la forme correspondant à la variété  $V^{n-p}$  orthogonale à  $V^p$ ; ce qui montre également que la forme associée à une forme complètement décomposable est complètement décomposable. 6/7

La correspondance entre forme et forme associée prend un autre aspect si on introduit l'espace dual de  $k^n$ , c'est-à-dire l'espace  $k_x^n$  des formes linéaires dans  $k^n$ ; cette dualité s'exprime par le fait qu'à tout élément  $u$  de  $k_x^n$  et à tout élément  $x$  de  $k^n$  correspond un élément de  $k$ ,  $(u, x)$ , à savoir la valeur de la forme  $u$  au point  $x$ .

Soit  $G^*$  l'algèbre extérieure construite sur  $k_x^n$ ; on trouve que l'ensemble des formes de degré  $p$  dans  $G^*$  peut être considéré comme l'espace dual de l'ensemble des formes de degré  $p$  dans  $G$  (par exemple, à toute forme décomposable  $U = u_1 u_2 \cdots u_p$  dans  $G^*$

et à toute forme décomposable  $X = x_1 x_2 \cdots x_p$  dans  $G$ , on fera correspondre  $(U, X)$  égal au déterminant des  $(u_i, x_j)$ ; et cette fonction bilinéaire  $(U, X)$  sera étendue par linéarité à toutes les formes de degré  $p$  dans  $G$  et  $G^*$ .

Notons que, de même que les formes de degré  $p$  dans  $G$  ne sont pas autre chose que les tenseurs covariants antisymétriques à  $p$  indices dans  $k^n$ , les formes de degré  $p$  dans  $G^*$  ne sont pas autre chose que les tenseurs contravariants antisymétriques à  $p$  indices; et  $(U, X)$  n'est pas autre chose que le « produit contracté » d'un tenseur covariant et d'un tenseur contravariant (tous deux antisymétriques) à  $p$  indices.

7/8 Mais, d'autre part, il y a également dualité, dans  $G$ , entre les formes  $A$  de degré  $p$  et les formes  $B$  de degré  $n-p$ , cette dualité s'exprimant par l'existence d'une fonction bilinéaire  $(A, B)$  définie par  $AB = (A, B) \cdot e_1 e_2 \cdots e_n$ , invariante par le groupe des *substitutions unimodulaires* sur les  $e_i$ . On en conclut qu'on peut établir, d'une manière invariante par rapport à ce même groupe, une correspondance entre les formes de degré  $p$  dans  $G^*$  et les formes de degré  $n-p$  dans  $G$ . Si maintenant, on établit d'une manière arbitraire une correspondance (ou pour mieux dire un isomorphisme) entre  $k^n$  et l'espace dual  $k_*^n$  (ce qui se fait par le moyen d'une forme bilinéaire  $B(x, y)$ , de déterminant non nul, qu'on se donnera dans  $k^n$ , et qui pourra par exemple être déduite d'une forme quadratique non dégénérée), on obtiendra une correspondance entre formes de degré  $p$  et formes de degré  $n-p$  dans  $G$ , invariante par un certain groupe de substitutions.

8/9 De la correspondance entre formes et formes associées Grassmann déduit une opération, dans  $G$ , qu'il appelle le *produit régressif*.<sup>[9]</sup> Soient  $A, B$  deux formes de degré  $p, q$ ; si  $p+q > n$ , on a  $AB = 0$ . Mais considérons la forme  $(A^* B^*)^*$ : elle est de degré  $p+q-n$ ; c'est elle que Grassmann appelle le produit régressif. Pour  $p+q = n$ , le produit proprement dit et le produit régressif existent tous deux, et sont alors liés par une relation très simple: si  $AB = c \cdot e_1 e_2 \cdots e_n$ ,  $c$  étant un élément de  $k$ , le produit régressif est  $c$ . En général, les considérations ci-dessus sur l'espace dual (ou une vérification directe) montrent que l'association entre deux formes et leur produit régressif est invariante par rapport au groupe des substitutions unimodulaires. Ceci permet de prévoir que le produit régressif permet d'exprimer certains faits géométriques, en dualité avec ceux qu'on exprime au moyen du produit extérieur. Par exemple, si  $A$  et  $B$  sont les formes correspondant à deux variétés  $V^p, W^q$ , le produit régressif s'annulera si  $V, W$  sont contenues dans une même variété de moins de  $n$  dimensions et, s'il n'en est pas ainsi, ce produit sera la forme correspondant à l'intersection de  $V$  et  $W$ .

### 3.— Formes différentielles

Sur une variété « différentiable » à  $n$  dimensions, on considérera, en chaque point, l'espace vectoriel à  $n$  dimensions des différentielles en ce point. C'est un espace ayant pour base, si l'on prend des coordonnées locales  $x_1, x_2, \dots, x_n$  au voisinage d'un point de la variété, les différentielles des coordonnées. Sur cet espace, on construit l'algèbre

extérieure  $G$  : les formes de  $G$  sont les formes différentielles extérieures sur la variété. il y a, ici encore, identité entre ces formes et les tenseurs covariants antisymétriques sur la variété. Une telle forme s'écrira :  $A(x) = \sum a_{i_1 i_2 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \cdots dx_{i_p}$ . Pour éviter des difficultés très sérieuses, on supposera les coefficients  $a(x)$  deux fois continument différentiables. 9/10

Tout ce qui a été dit plus haut subsiste ici : Tout d'abord, la notion de produit extérieur ; mais aussi la notion de forme associée, dès qu'on s'est donné une forme quadratique différentielle non dégénérée (c'est-à-dire un  $ds^2$ , mais qui n'a pas besoin d'être défini positif ; par exemple, en théorie électromagnétique (équations de Maxwell) intervient la notion de forme associée par rapport à la forme quadratique bien connue  $dx^2 + dy^2 + dz^2 - c^2 dt^2$ ).

Ce qui fait la nouveauté du calcul des formes différentielles extérieures par rapport au calcul de Grassmann, c'est l'opération de dérivation extérieure, introduite en analyse (semble-t-il) par M. Cartan. Par définition, si l'on a :

$$A = \sum a_{i_1 i_2 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \cdots dx_{i_p}$$

les  $a$  étant continument différentiables, on posera :

$$dA = \sum da_{i_1 i_2 \dots i_p}(x) dx_{i_1} \cdots dx_{i_p}$$

$da$  désignant la différentielle de  $a$  (qui est une forme de degré 1 de l'algèbre  $G$ ). Si  $A$  est une forme de degré  $p$ ,  $dA$  est une forme de degré  $p + 1$ . Cette opération satisfait aux lois suivantes :

- 1°- Si<sup>[10]</sup>  $A$  est une forme de degré 0, c'est-à-dire une fonction  $f(x)$  (continument différentiable),  $dA$  n'est autre que la différentielle ordinaire  $df$  (forme de degré 1). 10/11
- 2°- Si  $A, B$  sont des formes de degrés respectifs  $p, q$ , on a :

$$d(AB) = dA \cdot B + (-1)^p A \cdot dB$$

comme on le vérifie immédiatement (et trivialement) à partir de la définition.

- 3°- Quel que soit  $A$ , on a  $d(dA) = 0$ . Ce théorème, qu'on vérifie facilement, est au fond équivalent au théorème  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}$ , qui est un cas particulier (celui où  $A$  est de degré 0).

Réciproquement, ces trois propriétés, jointes à la linéarité ( $d(A + B) = dA + dB$ ) suffisent à déterminer entièrement l'opération  $d$ , comme on le voit immédiatement ; par conséquent, cette opération possède une signification invariante (indépendante du choix des coordonnées). C'est naturellement ce qui en fait l'importance.

Dans le cas où  $A$  est une forme de degré 1 (ou, comme on dit parfois aussi, une « forme de Pfaff », ou « expression de Pfaff »), on connaissait depuis longtemps le « covariant bilinéaire » associé à la forme, qui n'est autre que la forme bilinéaire formée avec les coefficients de  $dA$  ; ce covariant joue un grand rôle dans les travaux de 11/12

Frobenius. D'autre part, Poincaré, dans son mémoire « Sur les résidus des intégrales doubles »,<sup>[11]</sup> avait écrit des équations qui expriment  $dA = 0$ ; mais l'opération générale que nous désignons par  $d$  apparaît pour la première fois dans les travaux de M. Cartan (où elle est généralement notée  $A'$  et non  $dA$ ).<sup>[12]</sup> Il convient de noter que cette opération n'est autre que la dérivation tensorielle, pour les tenseurs covariants antisymétriques : on sait, en effet, que l'opération de dérivation tensorielle qui en général fait intervenir les  $g_{ik}$  de la forme quadratique fondamentale, en est indépendante dans le cas particulier dont il s'agit.

#### 4. – Aspect intégral

On peut se demander, réciproquement, étant donné une forme  $A$ , s'il y a une forme  $B$  telle que  $dB = A$ . D'après ce qui précède, il faut, pour qu'il en soit ainsi, que  $dA = 0$ . Réciproquement, si  $dA = 0$ , on vérifie sans aucune difficulté l'existence de  $B$  (qui s'obtiendra par des quadratures) *dans le voisinage d'un point donné* : on pourra par exemple, procéder par récurrence sur le nombre des variables (Cf. aussi les conférences ultérieures de H. Cartan, sur les systèmes de Pfaff). On en déduit  
<sup>12/13</sup>immédiatement que si  $dA = 0$ ,  $A$  peut être mis sous la forme  $dB$ , *si l'on se trouve sur une variété simplement connexe* (homéomorphe à l'espace à  $n$  dimensions).<sup>[13]</sup>

Ce résultat est étroitement lié au théorème de Stokes, dû, lui aussi, à M. Cartan.<sup>[14]</sup> Soit  $A$  une forme de degré  $p$ ; soit  $V^p$  une variété à  $p$  dimensions, c'est-à-dire une somme (à coefficients entiers, ou même plus généralement à coefficients dans le corps des nombres réels ou complexes) d'images continues, continument différentiables, de simplexes euclidiens, alors, l'intégrale de  $A$  sur  $V^p$  possède une valeur bien définie. Si l'on désigne par  $\dot{V}^p$  la *frontière* d'une variété  $V^p$  (c'est-à-dire la somme algébrique des frontières des simplexes composant  $V^p$ ) le théorème de Stokes s'écrit :

$$\int_{\dot{V}^{p+1}} A = \pm \int_{V^{p+1}} dA$$

$A$  étant une forme quelconque de degré  $p$ ,  $V^{p+1}$  une variété à  $p + 1$  dimensions ; le signe dépend de  $p$  et des conventions faites pour l'orientation de la frontière d'une variété. Il est clair que le théorème sera démontré si on le démontre pour un simplexe euclidien ; et dans ce cas il ne présente pas de difficulté.

#### 5. – Extension possible de la théorie

<sup>13/14</sup> De Rham, dans sa thèse et ses travaux ultérieurs,<sup>[15]</sup> a mis en évidence une analogie très profonde entre le calcul des formes différentielles extérieures et celui des variétés en topologie combinatoire. Au produit des formes correspond l'intersection des variétés, à la différentielle extérieure correspond la frontière ; et les règles formelles sur ces opérations sont exactement les mêmes si on fait correspondre aux formes de degré  $p$  dans un espace à  $n$  dimensions, les variétés à  $n - p$  dimensions.

Lorsque  $p = n$ , on a, d'une part, les formes de degré  $n$ , qui ne sont pas autre chose que les éléments de volume, c'est-à-dire les distributions de masse « régulières » (possédant une densité continue) dans l'espace étudié; d'autre part, les variétés à 0 dimensions, au sens de la topologie combinatoire, sont les sommes de points en nombre fini, à coefficients réels, c'est-à-dire, les distributions de masse concentrées en un nombre fini de points. On connaît la notion qui embrasse ces deux-là comme cas particuliers : c'est la notion de mesure de Radon (sur la droite, c'est la notion d'élément d'intégrale de Stiel[t]jes).

On peut conjecturer qu'il y a de même, dans le cas général, une notion embrassant à la fois celle de forme à  $n$  dimensions et celle de variété à  $n - p$  dimensions.<sup>[16]</sup> Cette notion n'a pas encore été trouvée; mais du moins, l'analogie entre formes et variétés a déjà conduit à des résultats remarquables; ceux-ci sont esquissés d'une manière très claire dans la conférence de de Rham, citée ci-dessous, et à laquelle je renvoie pour cette question.<sup>[17]</sup>

14/15

### Bibliographie.

- E.CARTAN – Leçons sur les *invariants intégraux* (Paris, Hermann, 1922)  
 E.KÄHLER – Einführung in die Theorie der Systeme von Differentialgleichungen (Hamburger Mathem.Einzelschriften, 1934)  
 G.de RHAM, Relations entre la topologie et la théorie des intégrales multiples (Enseignement Mathématique t.XXXV (1936) p.213).

### Notes

1. La bibliographie à la fin de l'article comprend le livre [Car22] d'Élie Cartan et le récent petit livre [Käh34] d'Erich Kähler, ainsi que la conférence [dR36] donnée par Georges de Rham.
2. Ce que l'on appelle aujourd'hui l'algèbre multilinéaire, ou extérieure.
3. L'exemplaire de Claude Chabauty montre qu'il a beaucoup travaillé sur cet exposé (termes soulignés au crayon, ajouts sur les pages de gauche...).
4. Le livre de Grassmann [Gra44] est paru en 1844.
5. Il faut lire  $e'_i$ .
6. Dans cet exposé, le mot variété désigne une variété linéaire, c'est-à-dire un sous-espace vectoriel.
7. C'est plutôt  $p = 1$ .
8. Dans le livre [Gra44] de Grassmann,  $A^*$  est noté  $|A$ , et l'élément « associé » est dit *Ergänzung* (complémentaire). Aujourd'hui, la notation est  $\star A$  et  $\star$  est appelée l'étoile de Hodge. La lecture de Grassmann est plutôt ardue. Je remercie le lecteur francophone anonyme qui a ajouté, il y a fort longtemps, quelques indications en français dans le volume I<sub>2</sub> des Œuvres de Grassmann (édition de 1896) de la bibliothèque de l'IRMA.
9. Le produit extérieur est appelé produit progressif.
10. Sur son exemplaire, Claude Chabauty a ajouté
  - 0)  $d(A + B) = dA + dB$



11. C'est l'article [Poi87].

12. Si c'est bien Élie Cartan qui a inventé la différentielle extérieure, la notation  $d$  est, semble-t-il, due à Kähler. Malgré l'inconvenance de la notation  $'$ , notons que c'est celle qu'utilisait encore de Rham, et qui ne l'a pas empêché d'inventer la cohomologie des formes différentielles. Par exemple, dans sa conférence [dR36], la formule de Stokes est écrite

$$\int_c \omega' = \int_{f(c)} \omega.$$

Élie Cartan adopta la « notation plus satisfaisante »  $d$  dès la deuxième édition [Car46] de son livre sur les espaces de Riemann (voir la préface). En même temps, il décida d'utiliser « différentielle extérieure » plutôt que « dérivée extérieure ».

13. Le sens actuel de « simplement connexe » n'était pas encore fixé.

14. Cette phrase pourrait être commentée longuement... Voir [Aud14].

15. Weil a choisi de citer [dR36], peut-être parce que c'est une conférence générale, dans laquelle les problèmes sont très clairement exposés, peut-être parce qu'il avait assisté à cette conférence. La thèse de de Rham a été publiée comme [dR31].

16. Ici, Claude Chabauty a ajouté, sur son exemplaire : « Courants ? » — un commentaire certainement pas contemporain du texte lui-même.

17. La conférence de Georges de Rham, qui fit l'objet de l'article [dR36], était l'une des conférences du colloque « Quelques questions de Géométrie et Topologie » organisé par l'Université de Genève en octobre 1935.

Cet exposé (et les travaux de de Rham) rattachent le programme de l'année (travaux d'Élie Cartan) à celui de l'année précédente (topologie) ; il était d'ailleurs annoncé par Weil dans un de ses exposés de l'année précédente. L'intérêt constant d'André Weil pour la topologie (et l'intégration) s'incarne ici dans son intérêt non moins constant pour le théorème de de Rham (qui donnera, par exemple, une dizaine d'années plus tard, l'article [Wei47]).

### Des archives du séminaire...

Paris, le 18 Novembre 1936

Monsieur,

Ainsi que vous en avez été prévenu en Juillet, le Séminaire de Mathématiques de 1936–37 s'est ouvert lundi dernier 16 Novembre. Le premier exposé fait par M. André Weil, a été consacré aux formes différentielles extérieures à titre d'introduction aux travaux de M. Élie CARTAN sur la théorie des groupes, sujet du Séminaire de cette année.

Dès à présent, il est prévu pour les 30 Novembre et 14 Décembre, deux conférences de M. Henri CARTAN sur les formes en involution.

Vous seriez aimable de me faire savoir si vous désirez, comme par le passé, suivre les travaux du Séminaire et recevoir les rédactions des exposés. Je pense qu'il sera possible, afin de favoriser ceux qui, comme vous, ont déjà participé aux frais de tirage, de réduire leur cotisation de 75 à 50 frs.

Dans l'attente d'une réponse favorable, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments dévoués.

Frédéric ROGER

en remplacement de M. André MAGNIER  
nommé professeur à Orléans

**Références**

- [Aud14] M. AUDIN – *La formule de Stokes, roman*, Cassini, 2014, à paraître.
- [Car22] É. CARTAN – *Leçons sur les invariants intégraux. Cours professé à la Faculté des Sciences de Paris*, Hermann, Paris, 1922.
- [Car46] ———, *Leçons sur la géométrie des espaces de Riemann*, Gauthier-Villars, Paris, 1946, 2<sup>e</sup> édition.
- [dR31] G. DE RHAM – « Sur l'analysis situs des variétés à  $n$  dimensions », *J. Math. Pures Appl. (9)* **10** (1931), p. 115–200.
- [dR36] ———, « Relations entre la topologie et la théorie des intégrales multiples », *Enseign. Math.* **35** (1936), p. 213–228.
- [Gra44] H. GRASSMANN – *Die lineale Ausdehnungslehre, ein neuer Zweig der Mathematiki*, Otto Wigand, Leipzig, 1844.
- [Käh34] E. KÄHLER – *Einführung in die Theorie der Systeme von Differentialgleichungen*, Hamburg. Math. Einzelschr., Teubner, Leipzig, Berlin, 1934.
- [Poi87] H. POINCARÉ – « Sur les résidus des intégrales doubles », *Acta Mathematica* **9** (1887), p. 321–380.
- [Wei47] A. WEIL – « Sur la théorie des formes différentielles attachées à une variété analytique complexe », *Comment. Math. Helv.* **20** (1947), p. 110–116.